

TABELA FORMAS FARMACÊUTICAS E VIAS DE ADMINISTRAÇÃO

FORMA FARMACÊUTICA	VIAS DE ADMINISTRAÇÃO	TIPOS	TAMANHOS MODELOS	ESPECIFICAÇÕES	INDICAÇÕES / VANTAGENS	
CÁPSULAS	VIA ORAL	GELATINOSA		00/0/1/2/3/4	Colágeno animal; coloridas ou transparentes	Facilita a deglutição; Adequado para a maioria das fórmulas e pacientes intolerantes a fórmulas em sachês.
	VIA ORAL	CLORIFILA		00/0	Vegetal com corante natural de clorofila	Adequada para vegetarianos; Formulações higroscópicas.
	VIA ORAL	OLEOSA		00/0	Sistema capsule/capsule que impede extravasamento do conteúdo oleoso	Melhor biodisponibilidade de fármacos lipofílicos (Ex: Vit A, D3; E; K2; Coenzima Q10)
	VIA ORAL	SPRINKLE		0	Cápsula de fácil abertura	Fórmulas com baixa dosagem de ativos (contrário ao sachê); Conteúdo pode ser diluído em água ou colocado diretamente nos alimentos.
	VIA ORAL	VEGETAL (Transparente Branca)		00/0/1/2	Vegetal à base de HPMC	Adequada para vegetarianos; Formulações higroscópicas.
	VIA ORAL	GASTRORESISTENTE (Transparente Branca)		00/0/1/2/3/4	Vegetal à base de HPMC, com componentes ácido-resistentes	Ativos sensíveis ao pH ácido do estômago; Também adequada para pacientes com sensibilidade gástrica.
	VIA ORAL	DUO CAPS		00/0	Sistema capsule/capsule que permite liberação rápida de ativos (cápsula externa) e liberação lenta de ativos (cápsula interna)	Otimização da eficácia para determinados ativos (Ex: Melatonina, Cortisol) melhorando biodisponibilidade e potencializando efeitos desejados.
	SUBLINGUAL VAGINAL VIA ORAL	TAPIOCA		00/0/1	Vegetal / Vegana - desenvolvida a partir de polissacarídeos da tapioca.	Alternativa aos Tabletes e Comprimidos SL. Alternativa aos Cremes e Óvulos vaginais. Adequada para vegetarianos e veganos; Formulações higroscópicas.
TABLETES COMPRIMIDOS	SUBLINGUAL	250mg (peso do comprimido)		Até 80mg de ativos	Ideal para ativos sensíveis à altas temperaturas. Manipulado por máquina de compressão direta.	Adequado para ativos que não precisam passar pelo metabolismo de primeira passagem; Ativos lipossolúveis ou de baixo peso molecular.
	SUBLINGUAL	150mg (peso do tablete)		Até 50mg de ativos	Preparo por moldagem, e a secam é feita em dessecadora a 35°C.	Adequado para ativos que não precisam passar pelo metabolismo de primeira passagem; Ativos lipossolúveis ou de baixo peso molecular.
	VIA ORAL	750mg (peso do comprimido)		Até 150mg de ativos	Preparo por aquecimento a 110°C em placa adequada.	Se desintegra muito rápido (até 60 segundos). Adequado para pacientes acamados, idosos e bariátricos. Não é adequado para ativos cuja estabilidade fica abaixo de 110°C.
	VIA TRANSMUCOSA	1000mg (peso do tablete)		Até 250mg de ativos	Base Resvin, com liberação lenta.	Adequado para ativos com baixa biodisponibilidade quando administrados por via oral (Ex: resveratrol, quercetina, crisina).
PÓS PARA PREPARO EXTEMPORÂNEO	VIA ORAL	Sachês		Acima de 500mg de ativos	Base efervescente, Base não efervescente, Shake; Refresco; Chá; Sopa; Capuccino	Facilita a administração de fórmulas com doses muito altas; Bases livres de açúcares, polióis, maltodextrina. A base efervescente é livre de sódio. As demais bases refresco, shake, etc, são também adequadas seguindo a mesma proposta das bases comuns.
	VIA ORAL	A GRANEL		Acima de 500mg de ativos	Base efervescente, Base não efervescente, Shake; Refresco; Chá; Sopa; Capuccino	Facilita a administração de fórmulas com doses muito altas; Bases livres de açúcares, polióis, maltodextrina. A base efervescente é livre de sódio. As demais bases refresco, shake, etc, são também adequadas seguindo a mesma proposta das bases comuns.
	VIA ORAL	SACHÊ POCKET		Acima de 250mg de ativos	Base Sachê Pocket (especialmente desenvolvida pela Cedroni)	Diferencial está na composição de sua base, pois possibilita administração direto na boca, sem diluição prévia em água.

TABELA FORMAS FARMACÊUTICAS E VIAS DE ADMINISTRAÇÃO

FORMA FARMACÊUTICA	VIAS DE ADMINISTRAÇÃO	TIPOS		TAMANHOS MODELOS	ESPECIFICAÇÕES	INDICAÇÕES / VANTAGENS
GOMA	VIA ORAL	10g (peso da goma) 5g (peso da goma)		Até 2g de ativo Até 800mg de ativo	À base de gelatina e colágeno animal, aquecida a 45°C. Livre de açúcar.	Pacientes em dieta ou pediátricos. Inadequada para ativos sensíveis à oxidação (meio aquoso), e para ativos com sabores amargos.
GOMA VEGANA	VIA ORAL	10g (peso da goma) 5g (peso da goma)		Até 2g de ativo Até 800mg de ativo	À base de goma carragena. Livre de açúcar.	Pacientes em dieta ou pediátricos. Inadequada para ativos sensíveis à oxidação (meio aquoso), e para ativos com sabores amargos.
BOMBOM	VIA ORAL	10g (peso do bombom)		Até 2g de ativo	Chocolate à 70% nutracêutico (livre de açúcar, proteína do leite, lactose, gordura trans).	Pacientes com dificuldade de deglutição e pediátricos. Permite administrar substâncias nauseantes (que podem causar enjoos) ou de sabor desagradável
PIRULITO	VIA ORAL	8g (peso do pirulito)		Até 2g de ativo	À base de Isomalte ou Base Gaudi (eritritol, polidextrose e ácido cítrico).	Auxilia na adesão à alguns tratamentos (Ex. compulsão por doces); Inadequada para ativos sensíveis a altas temperaturas.
GEL COMÉSTIVEL	INTERNO	25g (peso do sachê)		Até 10g de ativo	Veiculo em gel aquoso, sem polióis, com adoçantes naturais.	Adequado para alguns ativos para uso durante a prática de esportes.
SPRAY ORAL	SUBLINGUAL / AÇÃO LOCAL (Mucosa Bucal)	0,15ml/pump		10, 20, 30ml	Veículos líquidos adequados para ativo ou associações, respeitando a estabilidade de cada um.	Administração sublingual, e ação local para ativos como: Gymnema silvestres, Garcínia, Cromo, Lidocaina, Nistatina.
SPRAY NASAL	NASAL	0,08ml/pump		10, 20, 30ml	Veiculo isotônico e com pH adequado para a mucosa nasal.	Via de administração que pode veicular ativos para tratamentos locais (Ex.: rinite), ou para ação sistêmica, pois a via oral ou sublingual seriam inadequadas (Ocitocina, HCG), ou ainda, para ação a nível de SNC (Ketamin, Pinetonia).
SHOT / FLACONETE	INTERNO	10ml e 20ml		10ml: até 2g de ativos 20ml: até 5g de ativos	Veículos líquidos adequados para ativo ou associações, respeitando a estabilidade de cada um.	Doses unitárias, maior precisão para administrar doses em líquido; facilidade para transportar.
FILME ORODISPERSÍVEL	SUBLINGUAL	0,5g (peso do filme)		Até 50mg de ativo	Absorção rápida, via mucosa.	Destinado à veiculação e liberação rápida de ingredientes ativos na mucosa oral. EX: Tadalafila, Vitamina B12...
FILME VAGINAL	VAGINAL	50mg (peso do filme)		Até 20mg de ativo	Absorção rápida, via mucosa vaginal.	Destinado à veiculação e liberação rápida de ingredientes ativos na mucosa vaginal (hormônios), e veiculação de ativos para ação local (antifúngicos, probióticos).
VEÍCULOS LÍQUIDOS ORAIS	VIA ORAL	Suspensão Oral		Volume de dose adaptável de acordo com a dosagem total de ativos	Veículos adequados para via oral, em forma de suspensão, clean able (livre de polióis, parabenos, adoçantes artificiais, aditivos artificiais).	Facilitam a adesão de pacientes que apresentam dificuldade de deglutição de cápsulas. Adequado para pacientes idosos e pediátricos.
	VIA ORAL	Suspensão Oral		Volume de dose adaptável de acordo com a dosagem total de ativos	Veículos adequados para via oral, em forma de suspensão, clean able (livre de polióis, parabenos, adoçantes artificiais, aditivos artificiais).	Facilitam a adesão de pacientes que apresentam dificuldade de deglutição de cápsulas. Adequado para pacientes idosos e pediátricos.
	VIA ORAL	Suspensão Oleosa		Volume de dose adaptável de acordo com a dosagem total de ativos	Veículo oleoso à base de TCM, edulcorado com adoçante natural.	Facilitam a adesão de pacientes que apresentam dificuldade de deglutição de cápsulas. Adequado para pacientes idosos e pediátricos. Geralmente utilizado para vitaminas e ativos lipofílicos.
	VIA ORAL	Suspensão Extemporânea		Volume de dose adaptável de acordo com a dosagem total de ativos	Veículos adequados para via oral, em forma de suspensão, clean able (livre de polióis, parabenos, adoçantes artificiais, aditivos artificiais).	Facilitam a adesão de pacientes que apresentam dificuldade de deglutição de cápsulas. Adequado para pacientes idosos e pediátricos. Forma farmacêutica extemporânea desenvolvida para formulações que necessitam de refrigeração, e precisam ser transportadas por mais de 48 horas até chegar ao paciente.