



A toxina botulínica do tipo C é a mais indicada para efetividade miorelaxante visto que rompe o complexo SNARE não apenas em nível de SNAP 25 como faz a toxina A, mas também em SYNTAXINA.

## NANO BTX-C® REDUZ MARCAS DE EXPRESSÃO







(Fonte: Literatura NANO BTX-C® - Caregen)



Um painel realizado com 20 pacientes (10 homens e 10 mulheres) com idade média de 45 anos, um sérum contendo **NANO BTX-C**° a 10% aplicado duas vezes ao dia por quatro semanas, comprovou importante redução das marcas de expressão.

A aplicação direcionada de apenas 4 gotas do sérum viabiliza o tratamento mais concentrado.

## NANO BTX-C® REDUZ PEQUENAS IMPERFEIÇÕES

Linhas mais suaves que costumam marcar a pele em diferentes direções são suavizadas pela ação de **NANO BTX-C**<sup>®</sup>. Poros dilatados e suavização do microrelevo também são tratados por esta tecnologia. Para este painel, foram reunidos 18 pacientes com idade média de 40 anos. Um sérum contendo **NANO BTX-C**<sup>®</sup> a 5% foi aplicado duas vezes ao dia por quatro semanas.



(Fonte: Literatura NANO BTX-C® - Caregen)

## NANO BTX-C® A 5% É INDICADO PARA CORRIGIR AS LINHAS VERTICAIS E POROS DILATADOS



18 pacientes (8 homens e 10 mulheres) com idade média de 40 anos utilizaram durante 4 semanas um sérum contendo **NANO BTX-C**® a 5% 2x/dia apenas nas regiões de pequenas imperfeições.

## **SUGESTÃO DE FÓRMULA**

NANO BTX-C® \_\_\_\_\_\_ 5% NANOFACTOR® EGF\_\_\_\_\_ 2% Sérum Makimousse 12\_ qsp\_15ml

Aplicar 1 gota em cada canto periorbital e 2 gotas na região frontal.

Para acesso a demais protocolos use o QR CODE



DOSAGEM DE USO:

2 - 10%

Obs: Nano BTX-C® pode ser prescrito a 10% para rugas mais persistentes





