

REPHYLL

β -Cariofileno lipossomado, altamente biodisponível e estável

CEDRONI
MANIPULAÇÃO PERSONALIZADA




Imagem meramente ilustrativa

Tecnologia
indiana

Modo de uso

IN | Cápsulas

Dose usual

500mg ao dia (pode ser dividido em 2 doses)

Introdu

A dor crônica afeta entre 20 e 40% da população mundial em algum momento da vida, causando sofrimento, comprometimento funcional, incapacidade progressiva, elevado custo socioeconômico e isolamento social.

REPHYLL® possui uma exclusiva composição de origem natural para auxiliar no gerenciamento da dor, sendo obtido por isolamento do β -Cariofileno, um fitocanabinóide proveniente da piper nigrum, que através de um revolucionário sistema patenteado de última geração, conhecido por ZEAL™ Technology, é capaz de produzir lipossomas em pó altamente estáveis e biodisponíveis. O β -cariofileno é agonista seletivo dos receptores CB2, que são alvos terapêuticos para o tratamento da dor de diferentes etiologias e da inflamação, e desta forma, o β -cariofileno poderá contribuir para o alívio da dor.

A ativação do receptor CB2 inibe respostas à dor aguda, inflamatória e neuropática. É importante ressaltar que este agonista seletivo de receptores de canabinóides CB2 não causa efeitos colaterais no sistema nervoso central (SNC), sendo esta, uma característica importante de REPHYLL®, pois, a eficácia das terapias atuais para o tratamento da dor é frequentemente limitada por tais efeitos indesejáveis.

Desenvolvido por ZEAL™ Technology

Através da ZEAL™ Technology, as moléculas de β -Cariofileno são lipossomadas em pó, o que garante maior estabilidade e otimiza a sua biodisponibilidade, desta forma, alcançam uma entrega direcionada e seletiva, assegurando a contribuição aprimorada de REPHYLL®.



Benefícios

- Adjuvante no gerenciamento da dor crônica/inflamatória
- Adjuvante no gerenciamento da dor neuropática
- Adjuvante no gerenciamento de dores reumáticas
- Adjuvante no gerenciamento da dor muscular tardia (DOMS)
- Adjuvante no gerenciamento da dor “pós – lesão” em atletas
- Ausência de toxicidade
- Ausência de efeitos colaterais
- Não causa dependência

linha
NUTRI

REPHYLL® | VPK Farma

Acese o conteúdo
deste e de outros
produtos




Este material contém informações técnicas destinadas exclusivamente aos profissionais da área da saúde

Mecanismo de ação


Rephyll® é um agonista seletivo dos receptores CB2 periféricos e contribui para a antinocicepção sem efeitos canabinérgicos tradicionais. Desta forma, REPHYLL® é utilizado como adjuvante para o gerenciamento da dor e inflamação.

Estudos comprovam


Preparação e caracterização de β -cariofileno lipossomal (Rephyll®) por tecnologia de tecelagem de nanofibras e seus efeitos na dor muscular de início tardio (DOMS) em humanos: um estudo randomizado, duplo-cego, cruzado e controlado por placebo. Estudo realizado com 20 voluntários do sexo masculino entre 19 e 29 anos por um período até 23 dias, dividido em dois grupos aleatórios com a administração de REPHYLL® 500mg v.s. placebo.



Houve uma melhora estatística significativa na dor para o grupo que utilizou REPHYLL® em comparação ao grupo placebo, demonstrando a eficiente contribuição do REPHYLL® no auxílio do alívio da DOMS.



Houve uma melhora estatisticamente significativa da força isométrica no grupo que utilizou REPHYLL®, demonstrando sua contribuição no auxílio do gerenciamento da DOMS a partir do 4º dia.



A partir do 3º dia, foi possível notar que houve um aumento do ângulo do braço relaxado, que indica melhora na flexibilidade muscular com o uso de REPHYLL®.

Sugestões de Fórmulas

Adjuvante no gerenciamento da dor aguda após lesão

REPHYLL®	250mg
Excipiente	qsp...1 cápsula
Posologia: administrar 1 cápsula 2 vezes ao dia, por 10 dias, em seguida tomar 1 cápsula ao dia por mais 20 dias, ou conforme orientação do prescritor.	

Adjuvante no gerenciamento da dor articular

REPHYLL®	200mg
PEA	200mg
Colágeno Tipo II	20mg
Excipiente	qsp...1 cápsula
Posologia: administrar 1 dose de 12 em 12 horas ou conforme orientação do prescritor.	

Para consultar nossas referências bibliográficas, solicite a literatura técnica



www.cedroni.com.br | farmacia@cedroni.com.br
 11 2764-3700 | 3277-3753 | ☎ 11 9 9350-7997
 Av. da Aclimação 232 - São Paulo - SP - CEP 01531-000

