

ATIVO NATURAL INOVADOR PARA O CONTROLE DA ABSORÇÃO DE GORDURA DOS ALIMENTOS

NOME CIENTÍFICO: *Abelmoschus esculentus (L.) Moench (fruit), Inulin, citric acid.*


Dosagem usual:

Uso contínuo: 600mg, 15 minutos após as principais refeições (almoço e jantar)

Uso Esporádico: 1,3 a 2,6g, 15 minutos após a refeição rica em gordura

- Okralin™ é obtido do Okra, também conhecido como quiabo, cultivado em condições climáticas ideais na região da Tunísia;
- Padronizado em 10% de fibras solúveis, é composto por proporções ideais da pectina do quiabo, inulina e ácido cítrico, otimizando seu mecanismo de ação;
- Favorece a aglutinação da gordura presente na alimentação diária, minimizando a sua absorção e, conseqüentemente, modulando o peso corporal;
- Contribui para a redução de medidas do quadril e da cintura;
- Não interfere na absorção de vitaminas lipossolúveis, de acordo com estudo;
- Não causa desconfortos ou alterações vexatórias no funcionamento do intestino;
- Ativo vegetal e natural, desenvolvido através de tecnologia patenteada pela Nexira.

MECANISMO DE AÇÃO



2 É formado um complexo gelatinoso, grande demais para ser absorvido.

3 Dessa forma, a gordura não sofre a ação das lipases, sendo naturalmente eliminada nas fezes, limitando sua absorção e o ganho calórico.



Okralin™ possui a proporção ideal entre a pectina do quiabo e inulina, fibras solúveis que atuam em sinergia com o ácido cítrico também presente em sua composição, aglutinando os lipídeos dos alimentos, quando administrado 15 minutos após a refeição rica em gorduras. Neste processo é formado um complexo gelatinoso, que não sofre a ação das lipases intestinais, sendo grande demais para ser absorvido no intestino. O gel é, então, eliminado nas fezes de forma natural e segura, auxiliando no gerenciamento do peso e cuidado do colesterol, sem causar situações vexatórias ou afetar a absorção de vitaminas lipossolúveis.

ESTUDO *IN VIVO*

Estudo avaliou o efeito de Okralin™ na modulação do peso corporal:

- O estudo foi realizado com 108 homens e mulheres, com idades entre 18 e 65 anos e IMC entre 25 e 35, em uma dieta hipocalórica.
- Foram administrados 440mg ou 880mg de Okralin™, 3 vezes ao dia, 15 minutos após as refeições, durante 12 semanas.
- Os resultados demonstraram que Okralin™ contribuiu para a diminuição do peso corporal dos voluntários em mais de 5 kg, com resultados significativos em apenas 4 semanas, além de proporcionar redução de mais de 3 kg na gordura corporal e favorecer a redução de medidas da cintura (até 4,11cm) e do quadril (até 4,30cm).



Sugestões de Fórmulas

REDUÇÃO DE MEDIDAS COM AÇÃO LIPOLÍTICA E DETOXIFICANTE



Okralin™ _____ 600 mg

Administrar 1 dose 15 minutos após refeição rica em gorduras e calorias.

ASSOCIAR COM

Morosil® _____ 400 mg

Altlix™ _____ 100 mg

CactiN _____ 500 mg

Administrar 1 dose ao dia.

Okralin™ atua na manutenção do peso na redução da absorção de lipídeos presentes na dieta. **Morosil®** age na lipólise devido à ação sinérgica dos fitoquímicos presentes em sua composição, em especial a antocianina C3G. **CactiN** e **Altlix™** agem nas fases da detoxificação, contribuindo para reduzir os metabólitos tóxicos no organismo.

EFICÁCIA NO GERENCIAMENTO DO PESO

Uso Esporádico:



Okralin™ _____ 1,5g

Administrar 1 dose 15 minutos após refeição rica em gordura.

ASSOCIAR COM

Uso Diário

Morosil® _____ 400 mg

Administrar 1 dose ao dia.

No caso de pacientes que seguem uma dieta mais restritiva, **Okralin™** pode ser administrado esporadicamente após uma refeição com maior conteúdo lipídico, para auxiliar na manutenção da dieta. Sugerimos associar com **Morosil**, devido à sua capacidade de auxiliar na redução do peso e medidas. Também pode ser associado com ativos para a melhora da saúde intestinal (**Fibregum**, **Newbiome**), com ação detoxificante (**Cactin**, **Altlix**) ou para equilíbrio emocional (**Natur-Cell Limão Siciliano**, **Serenzo**, **Saffrin**, **Neuravend**), entre outros, conforme necessidade avaliada pelo prescriptor.

REDUÇÃO DA ABSORÇÃO DE LIPÍDIOS E AUMENTO DA LIPÓLISE



Okralin™ _____ 600 mg

Administrar 1 dose 15 minutos após refeição rica em gorduras e calorias.

ASSOCIAR COM

ID-alG™ _____ 200 mg

Morosil® _____ 100 mg

Chá Verde (EGCG 98%) _____ 100 mg

Administrar 1 dose 30 minutos antes do almoço e jantar.

Okralin™ contribui para a redução de absorção de lipídeos. **ID-alG™** ativa a termogênese, além de inibir as enzimas alfa-amilase, alfa-glucosidade e lipase. **Morosil®** otimiza a lipólise e o Chá Verde complementa esse cuidado, aumentando a biogênese mitocondrial.

GERENCIAMENTO DO PESO E CUIDADO DA HIPERCOLESTEROLEMIA



Okralin™ _____ 600 mg

Administrar 1 dose 15 minutos após almoço e/ou jantar.

ASSOCIAR COM

Bergavit _____ 250 mg

Administrar 1 dose, a noite.

Okralin™ pode ser administrado continuamente para auxiliar no gerenciamento do peso e na manutenção dos níveis de colesterol podendo, neste caso, ser associado com ativos específicos estatina-like e fibrato-like, como o **Bergavit**.

Referências:

Literatura do fornecedor (Nexira/França).



www.cedroni.com.br | farmacia@cedroni.com.br

11 2764-3700 | 3277-3753 | ☎ 11 9 9350-7997

Av. da Aclimação 232 - São Paulo - SP - CEP 01531-000

